

STRATÉGIE FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES AU GAEC LA HAULAIS



Quels impacts climatiques sur l'élevage ?

Variabilité des rendements maïs :



Variabilité des rendements herbe :




Quels leviers à disposition pour anticiper et limiter les aléas ?

	Chez GAEC LA HAULAIS	Chez vous ?
1. Pour limiter les besoins fourragers		
1. Limiter le nombre de VL	70 VL max	
2. Production par VL présente	7200 l/VL	
3. Race	PH	
4. Limiter le nombre de génisses	18/an (1 Gé sup. = 5 TMS/an)	
5. Des VL en bonne santé	20 % renouvellement	
6. Vêlage précoce	Vêlage 27 mois (1 mois sup. = 0,5 TMS/VL)	
2. Produire des fourrages en quantité		
1. Adapter la SFP aux besoins	1,1 - 1,5 UGB/ha	
2. Renouvellement des prairies	5 ans – 8 t MS/ha	
3. Choix des prairies pâturage	Fet + RGA + TB	
4. Choix des prairies stocks	RGH + TV	
5. Choix des prairies stocks + affour.	Luzerne + dactyle et RGH + TV	
6. Chaulage – fertilisation	Entretien + lisier porc	
7. Favoriser le pâturage	Drainage	
7. Système de pâturage	Tournant avec paddock journalier	
8. Valorisation des surfaces éloignées	Affouragement	
9. Gestion des stocks de sécurité	2 à 3 mois d'avance (soit 106 TMS)	
10. Prairies sous couvert	Surfaces non accessibles	
11. Achats extérieurs	Eventuels	
3. Un système polyculture + élevage souple (levier en cours)		
1. Augmenter surfaces accessibles	Echanges parcellaires	
2. Agrandissement	Céréales dans l'assolement	
3. Modulation surfaces en cultures	Ajuster chargement	

ANTICIPER LES ALÉAS À LA HAULAIS




Besoins annuels du troupeau




85 UGB x 6 t MS/UGB
Besoins mini : 510 t MS

Quel assolement prévisionnel sécurisé ?




Chargement moyen 1,3 UGB/ha

Quelle sensibilité climatique du système ?



PILOTAGE SELON LA TRÉSORERIE FOURRAGÈRE



Si < 1,5 tMS / UGB

- d'ha de céréales
Achat fourrage
Tri d'animaux

Achat foin
Paille/génisses
Tri d'animaux

Achat foin
Paille/génisses
Tri d'animaux

- d'ha de céréales
Achat maïs, Foin, paille
Dérobées d'été
Tri d'animaux

- d'ha de céréales
Méteils
fourragers (Sous couvert ou dérobés)
Tri d'animaux

Si > 1,5 tMS / UGB

+ d'ha de céréales,
+ VL et/ou moins de concentrés

Engraissement à l'herbe
+ de VL

Engraissement à l'herbe
+ de VL

Récolte maïs épi ou grain ou coupe haute
Vente herbe

Vente maïs